

# Avertissements agricoles

## AVERTISSEMENT GRANDES CULTURES

destiné aux Agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès,  
rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture.

N° 6 C du 11/06/97

GRANDES CULTURES N° 6

**TOURNESOL : Phomopsis: intervenez**  
**MAIS-SORGHO: Attention aux Pucerons et Cicadelles**

### TOURNESOL : PHOMOPSIS :

Actuellement la maturité des périthèces est suffisamment avancée pour permettre des projections d'ascospores à la moindre pluies; les premières ont été enregistrées la semaine dernière

2 cas peuvent se présenter selon le stade actuel de la culture et la sensibilité variétale :

**\* levées tardives: stade actuel 8-10 feuilles**

Les variétés sensibles et les oléiques doivent être conduites avec une protection double compte-tenu de leur sensibilité au Phomopsis d'autant qu'actuellement une pluie peut être contaminatrice

**Intervenez au stade 8-10 feuilles et renouvelez environ 15 jours après, au plus tard au stade limite passage tracteur**

**\* levées précoces: stade actuel apparition bouton étoilé = limite passage tracteur (LPT)**

Intervenez dès que possible sauf pour les variétés très peu sensibles type Agrisol-Amélia

Produits utilisables : **PUNCH CS** 0.8 L/Ha  
**CORBEL** 0.8 L  
**PUNCH CS + CORBEL** 0.4 L + 0.4 L

**Attention : en traitement précoce (avant le stade E1 bouton étoilé) seul le Punch est utilisable; le Corbel pouvant entraîner une phytotoxicité il doit être réservé au renouvellement ou traitement unique au stade LPT**

**BORE :** Si vous ne l'avez pas déjà fait vous pouvez rajouter du bore lors de votre intervention fongicide sur les parcelles à risques (carence) et d'office pour les variétés oléiques

Consultez votre technicien ou votre coopérative pour les produits à appliquer

**SORGHO ET MAIS (consommation- pour les maïs semences consultez les Avertissements spécialisés) : PUCERONS et CICADELLES**

Ces cultures sont très fortement envahies par les Pucerons et les Cicadelles; leur présence peut devenir dommageable par les nombreuses piqûres alimentaires; vous pouvez intervenir à l'aide de

**KARATE K** 1.25 L/Ha (pucerons seuls)

**KARATE** 0.4 L (dose cicadelles) ou 0.15 L si pucerons seuls



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
ZAC D'ALCO - B.P. 3056  
34034 MONTPELLIER CEDEX 01  
Tél. : 04 67 10 19 50 - Fax : 04 67 03 10 21

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON  
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'INSCRIPTION 531 AD  
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.  
Trésor Public de l'Hérault 00001003365